

ХЕЛПЭГС содержит в составе высокомолекулярный полиэтиленгликоль, который эффективен и безопасен при длительном применении (не вызывает привыкания). ХЕЛПЭГС интенсивно впитывает воду, благодаря чему увеличивает объем кишечного содержимого, размягчая его консистенцию не всасывается, не участвует в обменных процессах.

Эвакуация содержимого кишечника наступает через 2448 часа после первого приема, далее стул становится регулярным.

ХЕЛПЭГС:

- Не вызывает привыкания
- Не влияет на состояние микрофлоры кишечника
- Не выводит из организма полезные минералы и жирорастворимые витамины А,К,Е

ХЕЛПЭГС с витамином — не содержит сахар, обогащен витамином С.

Витамин С поддерживает обменные процессы в организме, проявляет антиоксидантное, антитоксическое и общеукрепляющее действие.

СОСТАВ на одну дозу (1 чайная ложка): препарат содержит 5,0 г полиэтиленгликоля, витамина С 0,06 г, подсластителя (аспартам, сахарин) 0,0035 г, натурального цитрусового ароматизатора 0,03 г.

Показания:

Способствует мягкой эвакуации содержимого кишечника при:

- Несбалансированном рационе питания, в частности, питании рафинированными, обработанными продуктами с недостаточным содержанием растительных волокон;
- Малоподвижном образе жизни, что влияет на развитие застойных явлений в малом тазу и на замедление эвакуации содержимого кишечника;
- Эмоциональных перегрузках;
- Злоупотреблении лекарственными средствами, в том числе слабительными;
- Возрастной атонии кишечника.

Способ применения:

Дети старше 14 лет и взрослые: по 10,0 г (2 ч. Ложки) на стакан теплой воды. Принимать 2 раза в день утром и вечером. Примечание: при растворении порошка в воде, соке или чае, необходимо подождать 23 минуты до его полного растворения. При приеме ХЕЛПЭГС необходимо дополнительное обильное питье! При достижении результата допускается снижение частоты употребления. Рекомендовано при занятиях фитнесом и как добавка к диетическим программам. Следует принимать до или во время еды.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенные поражения слизистой оболочки толстого кишечника, частичная или полная кишечная непроходимость, боли в животе неясной этиологии.

Особые указания:

Длительное применение препарата не рекомендуется без консультации врача.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре.

БАД не является лекарственным средством!

Сроки годности: 2 года. Беречь от детей.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.